

SPR

Sarampión Paperas Rubéola

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad causada por un virus. Las personas con sarampión pueden presentar algunos de los siguientes síntomas o todos: fiebre, tos, secreción nasal, manchas blanco-azuladas dentro de la boca, sarpullido con manchas rojas, diarrea y falta de apetito.

¿Qué tan contagioso es?

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas. De hecho, si 10 personas están en una habitación con alguien infectado, es probable que 9 de ellas enfermen de sarampión.



¿Qué son las paperas?

Las paperas son un virus que generalmente causa hinchazón en las glándulas salivales o parótidas, justo debajo de la oreja, y que dura aproximadamente entre 7 y 10 días. La hinchazón puede aparecer en uno o ambos lados de la cara de la persona infectada, provocando una apariencia similar a la de una ardilla. Esto puede ir acompañado de dolores musculares, fatiga, falta de apetito, dolor de cabeza y fiebre baja.

¿Qué tan contagiosas son?

Aproximadamente 6 de cada 10 personas susceptibles probablemente se contagiarán si se exponen a una persona infectada con el virus de las paperas.



Complicaciones de las paperas



Las paperas pueden causar hinchazón de los testículos en hasta 1 de cada 3 varones infectados. Como resultado, algunos de estos varones serán estériles.

En las mujeres embarazadas, las paperas pueden provocar la muerte del feto.

Otras complicaciones de las paperas pueden incluir:

- Meningitis
- Infecciones de oído
- Inflamación de los testículos
- Pancreatitis
- Sordera
- Encefalitis (inflamación del cerebro)
- Inflamación de los ovarios
- Miocarditis
- Aborto

¿Lo sabía?


Aproximadamente 50 de cada 100 hombres que tienen testículos inflamados debido a una infección de paperas sufrirán efectos a largo plazo. El resultado de esto puede ser la esterilidad.

¿Qué es la rubéola?

La rubéola es una infección viral. También se la conoce como sarampión alemán. La rubéola no siempre es una infección leve. Antes de la vacuna, nacían hasta 20,000 bebés cada año con defectos congénitos debido a la capacidad del virus de infectar al feto.

¿Qué tan contagiosas son?

Es probable que alrededor de 7 de cada 10 personas susceptibles se contagien si se exponen a una persona infectada con rubéola.




Complicaciones de la rubéola

La rubéola puede causar síntomas como sarpullido leve, fiebre baja, inflamación de los ganglios debajo de la oreja e inflamación transitoria de las articulaciones pequeñas. Otras complicaciones de la rubéola pueden incluir:

- Encefalitis (inflamación del cerebro)
- Disminución de plaquetas
- Síndrome de rubéola congénita (CRS), que puede presentarse en bebés por nacer durante el primer trimestre y causar defectos congénitos como sordera, autismo, daño esquelético y más

Cuando una mujer embarazada se contagia rubéola durante el primer trimestre del embarazo:



La vacuna

La vacuna SPR (o MMR) protege contra estas tres infecciones virales (sarampión, paperas y rubéola). La vacuna se administra en una serie de dos dosis, la primera entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años de edad.

Efectos secundarios de la vacuna SPR



Complicaciones del sarampión

Aproximadamente 3 de cada 10 personas que contraen sarampión desarrollarán complicaciones como:

- Infecciones de oído
- Sarampión hemorrágico
- Neumonía
- Trastorno de la coagulación
- Encefalitis (inflamación del cerebro)
- Muerte
- Panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE: una enfermedad caracterizada por un deterioro neurológico progresivo y muerte precoz)



Si alguien que no ha tenido sarampión entra en un ascensor u otro espacio pequeño hasta dos horas después de que haya salido una persona infectada, aún puede contagiarse sarampión.

VISITE
VACCINE.CHOP.EDU
PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN.



¡Obtenga más información!