

INFLUENZA

Comúnmente conocida como gripe, la influenza es un virus que infecta la tráquea o los bronquios (conductos respiratorios). Los síntomas aparecen de repente e incluyen fiebre alta, escalofríos, dolores musculares intensos y dolor de cabeza.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?



Casi todas las personas a partir de los 6 meses de edad deben recibir la vacuna contra la influenza cada año.


Excepción de la dosis:

Los niños menores de 8 años que no recibieron la vacuna contra la influenza antes o que tienen antecedentes inciertos de vacunación contra la influenza necesitan dos dosis.

Tipos de vacuna contra la influenza

Vacuna tradicional inactivada

Contiene virus de influenza completos que han sido cultivados en huevos e inactivados (muertos), por lo que no pueden causar influenza después de la vacunación.



Vacuna recombinante contra la influenza

Sólo contiene una proteína del virus de la influenza, llamada hemaglutinina, por lo que no puede causar influenza después de la vacunación.



Vacuna intranasal contra la influenza

Contiene virus de la influenza vivos y debilitados que pueden reproducirse en la nariz pero no en los pulmones, por lo que no puede causar influenza después de la vacunación.



Vacuna contra la influenza basada en cultivo celular

El virus de la vacuna se cultiva en células en el laboratorio en lugar de en huevos. Luego los virus se inactivan (se matan), por lo que no pueden causar influenza después de la vacunación.



¿Lo sabía?

Todas las vacunas contra la influenza protegen contra 3 tipos de la enfermedad



¡Obtenga más información!

VISITE VACCINE.CHOP.EDU PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

Comparación de la enfermedad de la influenza y la vacuna

Enfermedad contra vacuna



Síntomas típicos

- Fiebre alta
- Escalofríos
- Dolores musculares
- Dolor de cabeza
- Secreción nasal
- Tos

Los síntomas de la enfermedad suelen durar de 2 a 3 días.

Posibles complicaciones

- Neumonía
- Encefalitis
- Enfermedad cardíaca
- Síndrome de Guillain-Barré
- Muerte



Efectos secundarios

- Dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección
- Dolores musculares
- Dolor de cabeza
- Fiebre baja
- Dolor de garganta
- Secreción nasal
- Congestión leve

En general, los efectos secundarios de la vacunación duran de 1 a 2 días.

Efectos secundarios muy poco frecuentes

- Síndrome de Guillain-Barré



¡Obtenga más información!

VISITE [VACCINE.CHOP.EDU](https://vaccine.chop.edu) PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.