

Seguridad en el hogar

Bueno hijito,
ahora quédate quieto.



 The Children's Hospital of Philadelphia®
Hope lives here.®

Cada día aproximadamente 21 niños son hospitalizados por lesiones relacionadas con los andadores.

¿Sabía usted que...?

- Los andadores causan más heridas que cualquier otro producto para niños.
- El andador no contribuye a que el niño camine más rápido y puede, de hecho, retrasar la edad a la que el niño comienza a pararse, caminar y gatear.
- La mayoría de las lesiones asociadas a los andadores ocurren cuando un adulto está cerca.
- Su hijo podría caer por las escaleras en el andador, aún si existe una barrera de seguridad para bebés.
- Un niño en un andador puede moverse a una velocidad superior a tres pies por segundo.
- La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) recomienda la prohibición de la venta de andadores infantiles.

Sea cauto:

- Reemplace el andador por un corralito o un centro de juegos fijo.
- Insista en que en la guardería a la que asiste su hijo se usen únicamente centros de juegos fijos.

Programa de Kohl para la prevención de las lesiones infantiles

 The Children's Hospital of Philadelphia®
Hope lives here.®

©2014 The Children's Hospital of Philadelphia, Todos los derechos reservados. 9441/1M/10-14

Para obtener más información sobre la seguridad de sus hijos y futuros eventos familiares, visite www.chop.edu/kohlschildsafety.

KOHL'SCares